

## FERTILIZANTE SUSTANCIAS HÚMICAS

MODO DE USO:



**IBIACTIVE® Humic Plus** es un formulado de extractos húmicos procedentes de leonardita con un 80% de sustancias húmicas. Mejora la estructura del suelo al enriquecer el complejo arcillo-húmico, incrementando la macroporosidad y la capacidad de intercambio iónico del suelo. Además, activa y estimula el crecimiento radicular

**IBIACTIVE® Humic Plus** ofrece una fuente estable y uniforme de materia orgánica para todo tipo de cultivos y suelos, aportando de forma equilibrada y oportuna los elementos esenciales para el desarrollo de las plantas y favoreciendo el ciclo de rejuvenecimiento del suelo.

Se recomienda el uso de **IBIACTIVE® Humic Plus** para:

- · Aportar materia orgánica y mejorar la estructura del suelo
- · Activar y estimular el crecimiento radicular.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA			
<b>EXTRACTOS HÚMICOS TOTALES</b>	80% p/p		
ÁCIDOS HÚMICOS	65% p/p		
ÁCIDOS FÚLVICOS	15% p/p		
POTASIO (K <sub>2</sub> O)	10% p/p		

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:		
ASPECTO	Sólido	
COLOR	Grafito	
DENSIDAD A 20°C	1 g/cc	
рН	10 - 11	
SOLUBILIDAD EN AGUA	100%	
HUMEDAD RELATIVA	≤ 3%	
GRANULOMETRÍA	40 mesh - retiene un 5% y 200 mesh- retiene un 90%	
CONTENIDO DE METALES PESADOS	Cadmio (Cd) < 1 mg/Kg; Niquel (Ni) < 1 mg/Kg; Cromo (Cr) (total y hexavalente) <1mg/Kg; Plomo (Pb) < 1 mg/Kg; Mercurio (Hg) < 1 mg/Kg; Arsénico (As) < 1 mg/Kg.	

## **DOSIFICACIÓN GENERAL:**

CULTIVO	OBJETIVO	MOMENTO	DOSIS(kg/ha)
Uva de mesa	Mejorar las caracterís- ticas físicas y químicas del suelo.	A partir de los primeros riegos de la temporada o previo al peak de crecimiento radicular.	20 a 30 kg/ha. Parcializado en dosis de 5 a 10 kg/ha por aplicación.
Cerezos, ciruelos, nogales, almendros, avellanos, durazneros y nectarinos			20 a 30 kg/ha. Parcializado en dosis de 5 a 10 kg/ha por aplicación.
Manzano, Peral			20 a 30 kg/ha. Parcializado en dosis de 5 a 10 kg/ha por aplicación.
Cítricos, Paltos			20 a 30 kg/ha. Parcializado en dosis de 5 a 10 kg/ha por aplicación.
Arándanos, Frambuesas, Frutillas			20 a 30 kg/ha. Parcializado en dosis de 5 a 10 kg/ha por aplicación.
Tomate, Pimiento			20 kg/ha. Parcializado en dosis de 5 a 10 kg/ha por aplicación.
Melón, Sandía, Pepino, Zapallo			20 kg/ha. Parcializado en dosis de 5 a 10 kg/ha por aplicación.
Ajo y Cebolla			20 kg/ha. Parcializado en dosis de 5 a 10 kg/ha por aplicación.
Papa			20 kg/ha. Parcializado en dosis de 5 a 10 kg/ha por aplicación.
Hortalizas			20 kg/ha. Parcializado en dosis de 5 a 10 kg/ha por aplicación.
Cultivos			20 kg/ha. Parcializado en dosis de 5 a 10 kg/ha por aplicación.

(1) Según cada especie, se recomienda aplicar las dosis mayores en cultivos vigorosos o en plena producción. Para el caso de plantaciones jóvenes o con bajo vigor se sugiere aplicar la menor dosis descrita.

## **NOTAS Y ADVERTENCIAS**

- No mezclar con productos que contengan fosfatos, sulfatos, carbonatos, calcios y fertilizante de fuerte reacción ácida.
- · No superar el 20% de la concentración total en el estanque de aplicación.
- · Agitar antes de usar.
- Compatible con la mayoría de los abonos foliares y fitosanitarios comúnmente utilizados, sin embargo, se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad a nequeña escala antes de la anlicación.
- de compatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación.
   El producto utilizado bajo nuestras indicaciones cumple perfectamente su función. Sin embargo, por estar la aplicación fuera de nuestro control, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales por su uso no ajustado a las recomendaciones dispuestas en la etiqueta.
- El fabricante garantiza la composición, formulación y calidad del producto mientras esté bajo su control directo y se mantenga en su
- embalaje original cerrado, dentro de la fecha de vencimiento establecida en la etiqueta.
- Mantener el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35°C.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. En caso de contacto con la piel y ojos, lavarse inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión accidental acudir inmediatamente al médico, idealmente llevar la etiqueta del producto.
- Una vez vacío el envase realizar triple lavado según las siguientes instrucciones: agregar agua hasta ¼ de la capacidad del envase, agitar por 30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta operación 3 veces. Luego, destruir los envases (cortándolos o perforándolos) y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes, lejos de las áreas de pastoreo, viviendas y aguas. Es importante, no dañar la etiqueta durante todo este proceso.

## MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro representante de su zona o enviar un correo con sus dudas a consultas a info@ibiterra.com



